

**SCHEDA INFORMATIVA
INTERVENTO DI
FENOLIZZAZIONE DI UNGHIA INCARNITA**

Premessa

Per eliminare il problema dell'unghia incarnita senza sacrificare la lamina, come si faceva in passato, oggi si procede con la tecnica detta della "fenolizzazione della emimatrice" :

- Anestesia locale tronculare della parte da trattare
- Taglio con tronchese della parte laterale della lamina
- Estrazione della porzione incarnita
- Distruzione per "toccatore" di fenolo della porzione laterale della matrice
- Medicazione

L'intervento si svolge in ambulatorio, e dura circa 30 minuti.

Il paziente potrà immediatamente camminare; resta inteso che per 2 giorni dopo l'intervento dovrà fare attenzione a non praticare sport e/o lunghe camminate.

Preparazione all'intervento

Per potersi sottoporre a questo trattamento, l'unghia da trattare non deve essere infiammata, altrimenti l'anestesia risulterebbe non efficace; pertanto da 1 settimana prima dell'intervento :

- PEDILUVIO con AMUCHINA MED (già pronta e diluita) 2 volte al giorno (alla mattina ed alla sera) per circa 5 minuti; dopo il pediluvio ASCIUGARE molto bene; in particolare :
 - Pediluvio serale : dopo il pediluvio serale, dopo aver asciugato attentamente l'area, applicare CLOBESOL UNGUENTO, sotto OCCLUSIONE CON PELLICOLA di plastica, e tenere per tutta la notte
 - Pediluvio mattutino : al mattino, togliere la medicazione, procedere con il pediluvio con AMUCHINA MED ed applicare FUCICORT UNGUENTO con garza e cerotto

Segnaliamo che in alcuni casi (quando è presente il GRANULOMA PIOGENICO) è necessaria anche l'assunzione di antibiotico ZITROMAX COMPRESSE, 1 compressa al giorno per n. 3 giorni, dal giorno prima dell'intervento.

Post intervento

- Per 2 giorni post intervento : NO SPORT, NO LUNGHE CAMMINATE
- Per 7 giorni post intervento : LASCIARE IL DITO BEN MEDICATO, NON BAGNARE LA MEDICAZIONE
- Dopo 1 settimana : il medico eseguirà una nuova medicazione
- NB : la medicazione sia post intervento, che dopo 1 settimana, è abbastanza voluminosa, pertanto si ricorda la opportunità di utilizzare calzature larghe e comode
- Dopo 30 giorni dopo la medicazione (ovvero dopo 40 giorni dopo l'intervento) : il paziente viene rivisto per controllo