


## SCHEDA INFORMATIVA ALL'INTERVENTO DI OTOPLASTICA



L'otoplastica è un intervento che mira a ridare all'orecchio una forma naturale e gradevole.

L'intervento prevede delle incisioni cutanee a livello del padiglione auricolare, in genere in zone poco visibili, attraverso i quali viene raggiunta la cartilagine che sarà rimodellata per ottenere il risultato ricercato.

Le ferite chirurgiche vengono riparate con fili di sutura.



In seguito all'intervento è necessario indossare una medicazione compressiva per circa 1 mese.

Le complicanze sono rare ma quando intervengono, generalmente, rispondono prontamente ad un trattamento adeguato senza compromettere il risultato finale.

### Cicatrici

Le cicatrici che rimangono dopo questo intervento si rendono meno evidenti con il tempo, ma sono comunque permanenti. Occasionalmente può essere necessario una revisione della cicatrice in alcuni punti per ottenere il miglior risultato cosmetico possibile. Tali piccoli interventi possono essere eseguiti in anestesia locale. Il chirurgo utilizzerà tutte le tecniche volte ad ottenere una buona cicatrice, sottile e situata allo stesso livello della cute circostante. Esistono, però, fattori che possono modificare il normale processo di cicatrizzazione; essi sono: le anomalie della vascolarizzazione e dell'innervazione, la carenza di proteine, l'uso di farmaci antineoplastici, la microangiopatia diabetica ed il fumo di sigaretta. Esistono, inoltre, delle forme di cicatrizzazione patologica, sulla base di una predisposizione individuale, che possono determinare la formazione di una cicatrice ipertrofica o, nei casi più gravi, di una cicatrice cheloidea. Qualora dovesse verificarsi l'insorgenza di una cicatrice inestetica, sarà sempre possibile ottenere dei miglioramenti mediante terapia medica o chirurgica. Per prevenire la comparsa di una cicatrice inestetica è bene che il paziente non bagni la ferita fino alla rimozione dei punti di sutura (7-15 giorni), eviti sforzi eccessivi che possano comportare una eccessiva tensione sulla ferita ed eviti l'esposizione della cicatrice al sole per 6-12 mesi (eventualmente può essere utilizzata una crema a schermo totale dai raggi solari). Eventuali presidi utili per migliorare il processo di guarigione della ferita e l'evoluzione della cicatrice verranno indicati dal medico.

### Sanguinamento

Se interviene il sanguinamento dopo l'operazione, il sangue può accumularsi nell'area operata e può essere necessario riaprire la ferita al fine di rimuoverlo e prevenire ulteriori sanguinamenti. La formazione di ematomi o ecchimosi può essere la normale conseguenza di alcuni interventi chirurgici; tali sequele non costituiscono un pericolo per la normale guarigione delle ferite e si risolvono spontaneamente in alcuni giorni.

#### Infezioni

Esse sono generalmente rare e rispondono con prontezza alla terapia antibiotica topica o sistemica

#### Perdita di tessuti

E' estremamente rara; qualora dovesse accadere, può essere eseguito in un tempo successivo un intervento ricostruttivo con risultati comunque soddisfacenti

#### Disturbi della sensibilità

Possono permanere per qualche tempo, fino anche a qualche mese, dei disturbi della sensibilità nelle aree sottoposte all'intervento; questi disturbi si risolvono in genere spontaneamente

#### Dismorfie

Non sempre è possibile ottenere un risultato simmetrico e naturale. Eventuali interventi secondari vengono spesso effettuati per ottenere un miglioramento estetico o funzionale

#### Reazioni allergiche

L'utilizzo dei farmaci anestetici locali e di sostanze quali i disinfettanti e i cerotti, necessari per lo svolgimento dell'intervento, può indurre la comparsa di reazioni allergiche locali o sistemiche. Tali reazioni possono risolversi prontamente con la sospensione dell'utilizzo della sostanza interessata (cerotti, disinfettanti) o possono comportare delle reazioni sistemiche. La presenza di tali allergie viene indagata dal medico prima dell'intervento evitando di utilizzare le sostanze a cui il paziente riferisce di essere allergico